

Riceventi xenotrasplantanti

Comportamento sessuale

Persone il cui comportamento sessuale le espone ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con il sangue.

Alcolismo cronico

ESCLUSIONE TEMPORANEA

In presenza di una delle sottoelencate patologie o condizioni il candidato donatore deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per un periodo di durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata.
INFEZIONI: dopo malattia infettiva i donatori sono esclusi dalla donazione per almeno 2 settimane a decorrere dalla data della completa guarigione clinica. Si applicano tuttavia i seguenti periodi di esclusione per le infezioni indicate in tabella:

Glomerulonefrite acuta

5 anni dalla completa guarigione.
2 anni dalla completa guarigione.
2 anni dalla completa guarigione.
2 anni dalla completa guarigione.
2 anni dalla completa guarigione.

Brucellosi

Osteomielite

Febbre Q

Tubercolosi

Febbre Reumatica

2 anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica.

Toxoplasmosi Mononucleosi

Infettiva M. di Lyme

6 mesi dopo la data di guarigione

Febbre > 38 °C

2 settimane dopo la cessazione dei sintomi.

Affezioni di tipo influenzale

2 settimane dopo la cessazione dei sintomi.

Esclusione dalla donazione di sangue intero, emazie e piastrine per 1-3 anni successivamente al

Malaria: individui che sono vissuti in zona malarica nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi della loro vita

(*) A condizione che siano adottate misure per escludere l'uso clinico del plasma.

ritorno dall'ultima visita in zona endemica a condizione che la persona resti asintomatica. È ammessa la donazione di plasma da inviare al frazionamento industriale (*). Possono donare plasma da inviare al frazionamento industriale (*) individui con pregressa malaria 6 mesi dopo aver lasciato la zona di endemia; visitatori asintomatici di zone endemiche

28 giorni dopo aver lasciato una zona con casi di malattia nell'uomo nell'anno in corso nei periodi di endemia. 28 giorni dopo la risoluzione dei sintomi in casi in cui il donatore abbia contratto un'infezione WNV.

Virus del Nilo Occidentale (WNV)

Viaggi in zone endemiche per malattie tropicali
3 mesi dal rientro (valutare lo stato di salute del donatore dopo il rientro)

ESPOSIZIONE A RISCHIO DI CONTRARRE UN'INFEZIONE TRASMISSIBILE CON IL SANGUE

- Esame endoscopico con strumenti flessibili - Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago
- **Trasfusioni di emocomponenti o somministrazione di emoderivati** (*) - **Trapianto di tessuti o cellule di origine umana** (*)
- **Tatuaggi o body piercing**
- **Agopuntura, se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta** - Persone a rischio dovuto a stretto contatto domestico con persone affette da epatite B - Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive

- Rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezione da HBV, HCV, HIV. - **Intervento chirurgico maggiore** (*)
4 mesi dall'ultima esposizione a rischio.

(*)La patologia di base per la quale il candidato donatore ha ricevuto trasfusioni di emocomponenti o somministrazione di emoderivati o è stato sottoposto a trapianto di tessuti o cellule di origine umana o è stato sottoposto ad intervento chirurgico maggiore, rappresenta criterio prevalente ai fini della sospensione; poiché anche da detta patologia di base può derivare l'indicazione ad un tempo definito o permanente di sospensione.

VACCINAZIONI

Virus o batteri vivi attenuati 4 settimane.

Virus, batteri o rickettsie inattivati/uccisi 48 ore se il soggetto è asintomatico.

Tossoidi 48 ore se il soggetto è asintomatico.

Vaccini dell'Epatite A e B 48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione.

48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione. Se il vaccino è stato somministrato dopo l'esposizione, esclusione per 1 anno.

Rabbia

Vaccini dell'encefalite da zecche
Nessuna esclusione se il soggetto sia bene e se non vi è stata esposizione

ALTRE ESCLUSIONI TEMPORANEE

Intervento chirurgico minore 1 settimana.

Cure odontoiatriche

Cure di minore entità da parte di dentista o odontoiogenista esclusione per 48 ore. (N.B.: l'estrazione, la devitalizzazione ed interventi analoghi sono considerati interventi chirurgici minori).

Rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il principio attivo dei medicinali prescritti, la farmacocinetica e la malattia oggetto di cura

Terapie

Situazioni epidemiologiche particolari (per esempio focolai di malattie)
Esclusione conforme alla situazione epidemiologica.

Allergie a farmaci

Con particolare riguardo alla penicillina. Rinvio di un anno dopo l'ultima esposizione

Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo di un donatore ai fini della protezione dei riceventi la donazione: la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione.

